


# CALENDARIO 2018



## RISERVA NATURALE DELLE CORNATE FOSINI



# RISERVA NATURALE DELLE CORNATE E FOSINI



Area Naturale protetta dal 1996, si innalza poco a nord della località di Gerfalco, raggiungendo vette fino a 1060mt s.l.m., è nel comune di Montieri. L'area delle Cornate di Gerfalco è ricca di risorse minerarie come l'argento e, proprio da questa zona proviene il "persichino" (calcere rosso ammonitico) utilizzato nella realizzazione di numerose chiese e nella pavimentazione del Duomo di Siena.

## GENNAIO 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
1 CAPODANNO	2	3	4	5	6 EPIFANIA	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

# **LUPO** (*Canis Lupus*)

**CORPORATURA** : il lupo grigio ha maggiori dimensioni rispetto a quello rosso, per il suo muso e le orecchie meno appuntite.

Arti leggermente più lunghi di altri canidi, per cui si muove più rapidamente e con maggior agilità sulla neve.

**ALIMENTAZIONE**: si nutre di ungulati di media e grossa taglia, bestiame e carogne

**COLORE MANTELLO**: il mantello invernale è lungo e folto, di colore prevalentemente grigio variegato. Alcuni presentano anche mantelli bianchi, rossi, bruni o neri.



## FEBBRAIO 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

# FALCO PELLEGRINO (*Falco Peregrinus*)



**Specie:** rapace

**Lunghezza:** coda compresa, sfiora 50 cm.

**Apertura alare:** non supera di solito i 110 cm.

**Velocità:** capace di raggiungere in picchiata velocità di poco inferiori ai 300 km orari.

**Segni particolari:** si riconosce per il capo nerastro e il piumaggio sfumato nelle varie tonalità del grigio, in forte contrasto con il ventre, tendenzialmente biancastro o giallo, punteggiato di nero.

**Alimentazione:** non caccia mai a terra e mai

prede terrestri, cattura con la **stoccata** piccioni, colombacci o anatre selvatiche .

## MARZO 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

# LO SPARVIERO

## (Accipiter Nisus )



**Specie** : rapace

Rapace diurno di forma snella con testa piccola, ali brevi e coda lunga. La apertura alare raggiunge 60cm., mentre il corpo è di 30 cm.

Il piumaggio è grigio scuro sul dorso, più chiaro e con striature rossicce nella parte inferiore.

## APRILE 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
						1 PASQUA
2 PASQUETTA	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25 LIBERAZIONE	26	27	28	29
30						

# IL CARPINO NERO

(*Ostrya Carpinifolia*)

Il carpino nero appartiene alla specie *Betulaceae*. Può raggiungere un'altezza di 15- talvolta i 20 m. Il tronco è diritto e di sezione regolare con corteccia ruvida e fessurata, Il legno è considerato un discreto combustibile. I rami sono assurgenti così da formare una chioma slanciata, il cui diametro può raggiungere gli otto metri. Le foglie con apice acuminato hanno forma ovale e dentata. Un tempo erano usate per alimentare il bestiame quando l'erba dei prati era secca.



## MAGGIO 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
	1 FESTA DEI LAVORATORI	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

# VIOLETTA ETRUSCA

## (*Viola Etrusca Erben*)

E' un fiore endemico del territorio maremmano. Appartiene alla famiglia delle Violacee e fiorisce verso aprile-giugno e predilige terreni calcarei, sassosi e ad altezze elevate, ma anche prati e pascoli. Il colore è variabile dal violetto al giallo, tipicamente viola nella zona delle Cornate



## GIUGNO 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
				1	2 FESTA DELLA REPUBBLICA	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

# ROVERELLA



Resistente all'aridità, e capace di adattarsi anche a climi relativamente freddi.

È facilmente riconoscibile d'inverno in quanto mantiene le foglie secche attaccate ai rami, ciò ha permesso alla roverella attraverso i secoli, di resistere agli interventi distruttivi dell'uomo.

Le foglie sono tardivamente caduche, le ghiande provviste di cappuccio

## LUGLIO 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					



# PICCHIO MURAIOLO

( *Tichodroma muraria* )



Piccolo uccello con ampie ali arrotondate e coda breve; il corpo è grigio, la coda nera bordata di bianco, ali nere con macchie circolari bianche, ampia zona centrale rossa e il becco è lungo e sottile. Quando volazza lungo le pareti rocciose ricorda una grande farfalla

## AGOSTO 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15 FERRAGOSTO	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

# IL LECCIO (*Quercus Ilex*)

Appartiene alla famiglia delle Fagaceae. Presenta un fusto legnoso e raramente diritto. È un albero **sempreverde** e le sue ghiande, provviste di un cappuccio liscio, sono commestibili solo da animali come cinghiali e cervi. Le foglie hanno una forma che va dal lanceolato a quello ellittico.



## SETTEMBRE 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

# LA POIANA (Buteo Buteo)



Rapace di medie dimensioni, circa 50cm., di forma tozza, di color bruno, rossiccio e marrone.

Le ali sono ampie e la coda piuttosto corta, mentre la apertura alare di 110 cm.

Si nutre di piccoli mammiferi, rettili e carcasse di animali morti.

## OTTOBRE 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

# ***FRITILLARIA (Fritillaria Tenella)***



La Fritillaria Tenella appartiene alla famiglia delle Liliaceae.

Fiorisce tra aprile e maggio in prati aridi.

Spesso in alcune regioni è assenti (tra le quali Liguria, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia), invece è presente nel territorio delle Cornate, per questo motivo viene protetta .

## **NOVEMBRE 2018**

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
			1 OGNISSANTI	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

# ALBANELLA REALE

## (*Circus Cyaneus*)

**Specie:** rapace.

**Dimensioni:** intermedie tra il Falco di Palude e la più snella Albanella minore.

**Lunghezza:** media di poco inferiore al mezzo metro.

**Apertura alare:** non superiore ai 120 cm. Vola basso, salta e cammina

**Segni particolari:** ama stare in gruppo, coda abbastanza lunga e ali larghe, dove sono ben evidenti le cinque penne primarie, ha un tipico volo a bassa quota durante la fase di caccia.

**Alimentazione:** si ciba di ratti, piccoli uccelli, lucertole

**Specie in via di estinzione**

## DICEMBRE 2018

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
					1	2
3	4	5	6	7	8 IMMACOLATA	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25 NATALE	26 S. STEFANO	27	28	29	30
31						